

Calostro bovino 100% natural

Fuente de inmunoglobulinas esenciales, factores de crecimiento, grasa, lactosa, vitaminas y minerales necesarios para el correcto rendimiento y salud de sus terneros.

Tiene todos los componentes del calostro natural.

No contiene suero de sangre o huevo ni leche en su composición.

Seguro y efectivo

Aprobado por varias organizaciones mundiales como USDA, CFIA y MAPA.

Comprobado científicamente y con soporte técnico diferenciado en el mercado.

Beneficio y calidad a cualquier hora

Asegure el calostrado de su rebaño de forma rápida, segura y cómoda.

Ideal para animales nacidos en partos nocturnos.

Excelente opción para animales nacidos de FIV cuando se desconoce la calidad del calostro de las receptoras.

Indicado para partos prematuros, múltiples o auxiliados.

El calostro de baja o media calidad inmunológica puede ser enriquecido con Calostro 100, convirtiéndolo en un calostro de alta calidad inmunológica.

Formas de uso

1 Uso como enriquecedor o corregidor de calostro

Brix de calostro Fresco/Descongelado	Calidad Inmunológica
≥ 25%	Excelente
22-24%	Buena
19-21%	Media
≤ 18%	Baja



Después de evaluar la calidad inmunológica, si el calostro no alcanza al menos el 25% de Brix, o si queremos enriquecer el calostro a valores de Brix más altos, podemos hacerlo de manera sencilla, basta adicionar 1 medida (15 g) de Calostro 100 por cada litro de calostro fresco o descongelado, para aumentar 1% del valor de Brix (%).

La siguiente tabla demuestra la cantidad de gramos de calostro 100® a ser agregados en 2 litros de calostro fresco o descongelado, para aumentar el valor de Brix (%)

Tabla para enriquecimiento de calostro con Calostro 100®

¿A qué calidad quiero llegar?

¿Qué calidad de calostro tengo?	2 L	22%	23%	24%	25%	26%	27%	28%	29%	30%
	18%		120	150	180	210	240	270	300	330
19%		90	120	150	180	210	240	270	300	330
20%		60	90	120	150	180	210	240	270	300
21%		30	60	90	120	150	180	210	240	270
22%		0	30	60	90	120	150	180	210	240
23%		0	0	30	60	90	120	150	180	210
24%		0	0	0	30	60	90	120	150	180
25%		0	0	0	0	30	60	90	120	150

¿Cuántos g debo agregar para 2 L de Calostro fresco?

2 Uso como sustituto o reemplazo del calostro materno

¿Cómo preparar?

En 2 L de agua potable a temperatura de 43 a 49 °C adicionar dos paquetes de calostro 100®, mezclar hasta diluir bien el producto y posteriormente ofrecer al recién nacido en mamadera o sonda nasogástrica a 38 a 39 °C.

Para reemplazo utilizar como mínimo dos paquetes.



3 Uso sistema simplificado de calostro (SSC)

En caso de no medir calidad de calostro se recomienda utilizar 1/3 de la bolsa de Calostro 100® (156 g), esta cantidad debe ser agregada a los 4 litros del calostro materno recién ordeñado mezclar bien hasta diluir correctamente el producto, posteriormente ofrecer el calostro enriquecido.



¡¡IMPORTANTE! El preparado de este producto debe ser en las mejores condiciones higiénicas y con agua de calidad para garantizar su resultado.

Los terneros pueden nacer en medio de la noche, necesitando ayuda para el parto o como gemelos. Debemos estar lo más preparados posible. Hemos desarrollado un protocolo simple para ayudarlo a determinar cuándo su ternero necesita un **suplemento o sustituto** de calostro.

PROTOCOLO DE USO PARA TERNEROS NEONATOS DE CARNE

¿Cuál escenario describe mejor a su ternero recién nacido?

Escenario 1

- ✗ El ternero no mama.
- ✗ Ternero nació por cesárea o tuvo un nacimiento asistido.
- ✗ Condiciones húmedas, frías o extremo calor.
- ✗ Parto gemelar.
- ✗ Muerte de la madre.
- ✗ Ubre o teta de mala conformación o cuidado inadecuado, común en vaquillas de primer parto.

¡EL TERNERO NECESITA AYUDA!

Reemplace por Calostro 100® y alimente al ternero idealmente después del nacimiento, dentro de las primeras 2 horas de vida, administre 120 a 180 g de IgG (equivalente a 1 sobre de Calostro 100® de 470 g).



Escenario 2

- ✓ El ternero está de pie.
- ✗ El ternero es lento para mamar.

¡EL TERNERO NECESITA ALGO AYUDA!

Alimente con Calostro 100® idealmente después del nacimiento, dentro de las primeras 2 horas de vida, administre 50 g a 60 g de IgG (equivalente al medio sobre de Calostro 100® de 235 g).



Escenario 3

- ✓ El ternero está de pie.
- ✓ El ternero está mamando vigorosamente.
- ✓ La vaca y el ternero permanecen en contacto.

NO HACE FALTA INTERVENIR



6 a 12 HORAS MÁS TARDE

- ✗ El ternero es aún lento para pararse.

¡EL TERNERO NECESITA MÁS AYUDA!

Dele una segunda toma de Calostro, administre 120 g a 180 g de IgG (equivalente a 1 sobre de Calostro 100® de 470 g).



- ✓ El ternero está de pie y mamando vigorosamente.

NO HACE FALTA INTERVENIR



CALOSTRO 100[®]

y su uso en ovinos y caprinos

La mejor protección para los recién nacidos

El Calostro bovino en polvo puede ser utilizado para sustituir el calostro de cabras y ovejas, formulado para proteger a los recién nacidos, permitiéndoles expresar todo su potencial productivo.

- » Reduce la morbilidad y la mortalidad.
- » Proporciona anticuerpos esenciales.
- » Práctico y fácil de usar.

Posología:

Suministrar 10 g del producto por kg del peso corporal al nacer, diluirlo en agua potable a 45 °C.

Vea los ejemplos:

Peso del recién nacido (kg)	Cantidad del producto (g)	Cantidad de agua (mL)
3	30	110
4	40	150
5	50	190

Suministrar 2 dosis en las primeras 18 horas de vida, en una mamadera

IMPORTANTE

Cada paquete de Calostro 100[®] contiene 470 g de producto

